

BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  
**CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1161/BVTV-QLSVGHR  
V/v ban hành quy trình kỹ thuật quản

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐẾN Số: 2923  
Ngày: 06/7  
Chuyên: QĐ: M

lý bệnh chổi rồng hại nhãn

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trồng nhãn

Trong thời gian qua, Cục Bảo vệ thực vật đã tổng hợp các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện Bảo vệ thực vật; kết quả thực hiện mô hình phòng chống bệnh chổi rồng hại nhãn; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo phòng chống bệnh của địa phương để hoàn thiện quy trình.

Nay, Cục Bảo vệ thực vật ban hành Quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chổi rồng hại nhãn để các địa phương tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng phòng chống bệnh hiệu quả hơn.

Quy trình này thay thế các Quy trình tạm thời và Sổ tay hướng dẫn phòng trừ bệnh chổi rồng nhãn đã ban hành trước ngày 28/6/2016.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh trồng nhãn chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo ngay về Cục để kịp thời xử lý.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để chỉ đạo);
- Cục Trồng trọt, TT KNQG (để p/h);
- TT BVTV phía Nam;
- CC TT&BVTV các tỉnh trồng nhãn;
- Viện KHNNVN, Viện BVTV, Viện CẢQ MN;
- Lưu VT, QLSVGHR.

**CỤC TRƯỞNG**



**Hoàng Trung**



## QUY TRÌNH KỸ THUẬT

### QUẢN LÝ BỆNH CHỐI RỒNG NHÃN

#### I. MỤC TIÊU

Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để quản lý bệnh chối rồng nhãn hiệu quả, góp phần bảo vệ và phát triển sản xuất nhãn an toàn bền vững.

#### II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng nhãn trên lãnh thổ Việt Nam.

#### III. NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ ĐẶC ĐIỂM GÂY HẠI

##### 1. Nguyên nhân

Nhện lông nhung *Eriophyes dimocarpi* gây hại các bộ phận non của cây nhãn tạo ra triệu chứng chối rồng.

##### 2. Triệu chứng

Khi bị nhện hại, triệu chứng chối rồng xuất hiện rất sớm trên đọt non và trên bông.

Trên đọt non: đọt phát triển dài 2-3 cm bắt đầu có hiện tượng bị co lại, sau phát triển chậm, tạo thành chùm như bó chổi; nhện hại trên lá già không biểu hiện triệu chứng chối rồng.

Trên bông: các gié hóa cũng bị co lại tạo thành chùm như bó chổi, không đậu hoặc đậu rất ít trái.

##### 3. Đặc điểm gây hại và phương thức lan truyền

Nhện lông nhung rất nhỏ không nhìn thấy được bằng mắt thường. Vòng đời của nhện lông nhung rất ngắn (khoảng 8-15 ngày), hình thành 13-15 thế hệ trong một năm.

Nhện lông nhung gây hại chủ yếu trên các bộ phận còn non (cơi đọt và bông). Nhện chích hút trên cả 2 mặt lá của đọt non tạo ra lớp lông mịn và sổng trong đó, trên lá già nhện có thể sống ở mặt dưới lá.

Nhện lông nhung phát sinh mạnh vào các đọt cây nhãn ra đọt non ra bông, gây hại nặng nhất trong những tháng mùa khô (tháng 2, 3, 4 và tháng 11-12).

Nhện lông nhung di chuyển rất chậm nên phát tán chủ yếu nhờ gió và qua vận chuyển giống.

## **IV. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỆNH CHỖI RỒNG NHÃN**

### **1. Giống nhãn**

- Trồng giống nhãn chống chịu bệnh chổi rồng và nhện lông nhung; không nhân giống ở các vườn bị bệnh chổi rồng.

- Ở vùng bị bệnh chổi rồng gây hại nặng nên trồng mới hoặc ghép cải tạo bằng giống nhãn chống chịu bệnh.

- Với vườn trồng mới nên xử lý nhện lông nhung trên cây giống trước khi trồng bằng thuốc BVTV hóa học.

### **2. Biện pháp canh tác**

- Sau khi thu hoạch nhãn cần vệ sinh vườn, loại bỏ các cây ký chủ phụ trong hoặc gần vườn nhãn (như cây bóng nẻ, cây bồ ngót).

- Bón phân NPK cân đối, tăng cường phân hữu cơ, phân bón trung vi lượng giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt ra hoa tập trung.

- Trong mùa khô cần tưới đủ nước, che phủ gốc bằng xác thực vật hoặc phủ bùn (sinh) vào gốc cây để giữ ẩm độ giúp cây sinh trưởng tốt tăng khả năng chống chịu sâu bệnh.

### **3. Biện pháp hóa học**

**a) Đối với vùng bị bệnh chổi rồng hại nặng:** cần phun thuốc trừ nhện lông nhung (có thể kết hợp với dầu khoáng), thời điểm phun:

- Cơi đọt 1, 2: phun thuốc trừ nhện lông nhung khi đọt nhú 0,5-1 cm (phun kỹ lên đọt non, lá bánh tẻ và lá già).

- Cơi bông: phun thuốc trừ nhện lông nhung khi mầm hoa nhú 1-2 cm (phun kỹ lên mầm hoa, đọt non, lá bánh tẻ và lá già).

**b) Đối với vùng bị bệnh chổi rồng hại nhẹ:** tập trung phun thuốc trừ nhện lông nhung khi nhãn ra cơi đọt 1 và cơi bông, thời điểm phun như trên.

Sử dụng thuốc trừ nhện lông nhung trong Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành hàng năm và tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”.

Sử dụng luân phiên các loại thuốc trừ nhện lông nhung có cơ chế tác động khác nhau hoặc có hoạt chất khác nhau để tránh nhện lông nhung kháng thuốc.

**Sau khi phun thuốc trên cơi bông không phun thuốc trừ nhện lông nhung cho đến thu hoạch nhãn.**

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Quy trình này thay thế các Quy trình hoặc Sổ tay hướng dẫn phòng chống bệnh chổi rồng nhân ban hành trước ngày 28/5/2016.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có trồng nhân áp dụng quy trình.

**CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT**