SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH TRÀ VINH
CHI CỤC TRỒNG TRỌT-BVTV

Số: 13 /BC-BVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
ĐẾN Số: 3161
Ngày: 20/7
Chuyển: CBĐ

THÔNG BÁO
Phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông
Vụ Hè thu năm 2016

1/ Tình hình chung:

Tính đến nay vụ Hè thu năm 2016 đã xuống giống dứt điểm với diện tích 77.517,56 ha (đạt 99,38% so kế hoạch, giảm 1.715,24 ha so cùng kỳ). Trà lúa đang tập trung giai đoạn đẻ nhánh (chiếm 44,7 % diện tích xuống giống) - đòng trổ (chiếm 50 % diện tích xuống giống). Với điều kiện thời tiết mưa nhiều, sáng sớm có nhiều sương mù là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh và phát triển.

2. Diễn biến tình hình nhiễm bệnh đạo ôn:

Theo báo cáo của Trạm BVTV các huyện, toàn tỉnh đến nay có khoảng 8.061 ha diện tích lúa bị nhiễm đạo ôn lá tỷ lệ bệnh phổ biến 5- 30%, cục bộ có 3.322 ha tỷ lệ 30-50% (cấp 3-5) và 1.441,8 ha tỉ lệ >50% (cấp 5-7). Thực tế áp lực bệnh còn khá cao, nguồn bệnh có khả năng lây lan trên diện rộng nếu như thời tiết thích hợp, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên những vùng đã nhiễm đạo ôn lá ở đầu vụ Hè thu 2016.

Hiện nay bệnh đạo ôn cổ bông đã bắt đầu xuất hiện tại các huyện Càng Long, Tiểu Cần trên trà lúa giai đoạn trổ. Tuy nhiên do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và liên tục nên tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh và phát triển mạnh trong thời gian tới.

3. Biện pháp quản lý trong thời gian tới:

Để quản lý tốt bệnh đạo ôn cổ bông cần thực hiện một số biện pháp sau đây:

①. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết kết hợp với thăm đồng thường xuyên để chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông giai đoạn lúa đòng trổ và phơi màu (tung phấn).

②. Giữ mực nước trong ruộng từ 3-5cm giúp cho cây lúa trổ bông được tốt hơn, đồng thời giúp làm tăng hiệu lực của thuốc.

③. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông thì biện pháp phòng là chính, do đó việc phòng ngừa giai đoạn này cần phun 2 lần trước trổ và sau khi lúa trổ đều. Thời gian phun thuốc lần 1 khi lúa trổ lẹt xẹt (trổ từ 3-5%) và lần 2 khi lúa đã trổ đều.

* Phun thuốc có chứa hoạt chất Tricyclazole, Fenoxanil, Isoprothiolane. Việc phun thuốc phòng bệnh rất có hiệu quả vì khi bông lúa mới trổ còn non mềm, nấm dễ

dàng xâm nhập vào cổ bông, gié bông và hạt lúa; tùy theo các điều kiện phù hợp mà mức độ gây hại khác nhau.

*** Lưu ý:**

- Phun thuốc cần tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng".
- Pha thuốc phải đảm bảo lượng nước (2 bình/1.000 m^2; 25 lít/bình) , điều chỉnh béc phun cho hạt thuốc thật mịn, nhằm giúp thuốc rãi đều trên lúa trong điều kiện áp lực bệnh còn cao.
- Nên phun thuốc lúc trời mát, tránh phun thuốc khi lúa đang trổ (từ 8-12 giờ trong ngày).
- Sau khi phun gặp mưa phải phun lại.
- Có thể phối hợp thuốc trừ bệnh đạo ôn cổ bông với thuốc trừ vi khuẩn trong 2 lần phun ngừa để ngừa bệnh lem lép hạt và bệnh do vi khuẩn.

Nơi nhận:
- Sở NN-PTNT Trà Vinh (b/c);
- Phòng NN-PTNT các huyện;
- Phòng Kinh tế Tp. Trà Vinh;
- Trạm BVTV các huyện;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Phòng BVTV;
- Lưu VP.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM * SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT T.TRÀ VINH * CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Mai Thị Thu Ga